

Los medicamentos antivirales actúan al interferir en la capacidad del virus de la COVID-19 para reproducirse dentro del cuerpo. Disminuyen la “carga viral”, que es la cantidad de virus que los médicos encuentran en el cuerpo. Esto puede ayudar a reducir la gravedad de los síntomas de la COVID-19 y acortar la duración de la enfermedad.

Este cuadro es para fines informativos únicamente. Los tratamientos requieren una receta y deben tener la orientación del equipo de profesionales médicos del paciente.

Paxlovid¹ (comprimidos de nirmatrelvir y ritonavir)

Aviso importante: Paxlovid puede afectar a la eficacia y la seguridad de determinados medicamentos para el cáncer. Se debe tomar con la orientación de su oncólogo

Autorizado para	Tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada confirmada mediante una prueba positiva de COVID-19 en <u>pacientes no hospitalizados</u> que tienen un alto riesgo de progresar a infección grave (como los pacientes y sobrevivientes de cáncer de la sangre) El tratamiento con Paxlovid <ul style="list-style-type: none"> • No se debe usar para prevenir la infección por el virus de la COVID-19 • No tiene autorización de uso durante más de 5 días consecutivos
Edades	Adultos de 18 años en adelante Niños de 12 años en adelante que pesan al menos 88 libras
Actividad contra la variante ómicron	Eficaz contra la variante ómicron en estudios de laboratorio preliminares y con probabilidades de ser eficaz en los pacientes ^{2,3}
Dosis/momento adecuado	<ul style="list-style-type: none"> • El tratamiento debería comenzar lo antes posible después del diagnóstico de la COVID-19 y en los primeros 5 días a partir de la aparición de los síntomas • Tres comprimidos (2 de nirmatrelvir y 1 de ritonavir) que se toman juntos dos veces al día durante 5 días • Se pueden tomar con o sin comida
Fabricante	Pfizer Haga clic aquí para leer la Hoja informativa del fabricante para pacientes, padres y cuidadores (en inglés).

Lagevrio⁴ (molnupiravir)

Autorizado para	Tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada confirmada mediante una prueba positiva de COVID-19 en <u>pacientes no hospitalizados</u> que tienen un alto riesgo de progresar a infección grave (como los pacientes y sobrevivientes de cáncer de la sangre) El tratamiento con Lagevrio <ul style="list-style-type: none"> • No se debe usar para prevenir la infección por el virus de la COVID-19 • No tiene autorización de uso durante más de 5 días consecutivos
Edades	Adultos de 18 años en adelante
Actividad contra la variante ómicron	Eficaz contra la variante ómicron en estudios de laboratorio preliminares y con probabilidades de ser eficaz en los pacientes ^{2,3}
Dosis/momento adecuado	<ul style="list-style-type: none"> • El tratamiento debería comenzar lo antes posible después del diagnóstico de la COVID-19 y en los primeros 5 días a partir de la aparición de los síntomas • Cuatro cápsulas que se toman cada 12 horas durante 5 días • Se pueden tomar con o sin comida
Fabricante	Merck & Co., Inc. Haga clic aquí para leer la Hoja informativa del fabricante para pacientes, padres y cuidadores (en inglés).

Veklury⁵ (remdesivir)	
Autorizado para	Tratamiento de la COVID-19 de leve a moderada confirmada mediante una prueba positiva de COVID-19 en pacientes no hospitalizados que tienen un alto riesgo de progresar a infección grave (como los pacientes y sobrevivientes de cáncer de la sangre)
Edades	Adultos de 18 años en adelante Pacientes pediátricos de 28 días en adelante que pesan 3 kg como mínimo (aproximadamente 6.6 libras)
Actividad contra la variante ómicron	Eficaz contra la variante ómicron en varios estudios de laboratorio y con probabilidades de ser eficaz en los pacientes con COVID-19 ⁶
Dosis/momento adecuado	El remdesivir requiere infusiones intravenosas (IV) o inyecciones en un establecimiento de cuidado de la salud. Se debe comenzar la administración tan pronto como sea posible después del inicio de los síntomas El tratamiento debe comenzar dentro de los siete días de la aparición de los síntomas y tiene una duración de tres días
Fabricante	Gilead Haga clic aquí para leer la Hoja informativa para pacientes del fabricante.

1. Hoja informativa para proveedores de atención médica: Autorización de uso de emergencia de Paxlovid
2. Dabrowska A et al. Efficacy of antiviral drugs against the omicron variant of SARS-CoV-2.
3. Vangeel L et al. Remdesivir, molnupiravir and nirmatrelvir remain active against SARS-CoV-2 omicron and other variants of concern.
4. Hoja informativa para proveedores de atención médica: Autorización de uso de emergencia de Molnupiravir
5. Información de prescripción de Veklury. Revisado el 4/2022.
6. Veklury (remdesivir) retains antiviral activity against omicron, delta and other emergent SARS-CoV-2 variants in multiple in vitro studies (comunicado de prensa en inglés).

Desde el 27 de mayo de 2022

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS) es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el mieloma y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Obtenga más información en www.LLS.org.