


para pacientes inmunocomprometidos de forma moderada a grave
Incluye a los pacientes con cáncer de la sangre y la mayoría de los sobrevivientes

Si está inmunocomprometido de forma moderada a grave, tiene un riesgo más alto de sufrir COVID-19 grave y la muerte. Además, la respuesta inmunitaria a la vacuna puede no ser tan fuerte como en las personas que no están inmunocomprometidas, por lo que se necesitan dosis de vacuna adicionales. Incluso tras recibir todas las vacunas recomendadas, LLS recomienda que los pacientes con cáncer de la sangre tomen precauciones adicionales, como llevar mascarilla y cumplir con el distanciamiento social.


Los cuadros a continuación incluyen información sobre la cantidad de dosis y el momento adecuado para recibir la vacuna contra la COVID-19 para todas las personas de 6 meses de edad en adelante. Las personas deben consultar con su proveedor de atención médica sobre cualquier cambio en la cantidad de dosis y el momento adecuado debido al diagnóstico de cáncer o su tratamiento, o sobre la recepción de anticuerpos monoclonales (puede encontrar más información en nuestras [preguntas frecuentes sobre la COVID](#)).

Moderna (Spikevax)

Edades 6 meses – 17 años



Edades de 18 años en adelante



Pfizer-BioNTech (Comirnaty)

Edades 6 meses – 4 años



Dosis primaria 1



Esperar
3 semanas



Dosis primaria 2

Dosis primaria adicional
para pacientes
inmunocomprometidos



Esperar
al menos
8 semanas



Dosis
primaria 3

AVISO: Los niños de 6 meses a 4 años de edad que aún no hayan comenzado su serie principal de tres dosis con la vacuna Pfizer o que aún no recibieron la tercera dosis, deben recibir la vacuna actualizada (bivalente) como la tercera dosis primaria. Quienes ya completaron la serie de tres dosis con la vacuna monovalente no son elegibles para recibir un refuerzo actualizado (bivalente).

Edades 5 – 11 años



Dosis primaria 1



Esperar
3 semanas



Dosis primaria 2

Dosis primaria adicional
para pacientes
inmunocomprometidos



Esperar
al menos
4 semanas



Dosis
primaria 3



Esperar
al menos
8 semanas
(2 meses)



Refuerzo
bivalente

Edades de 12 años en adelante



Dosis primaria 1



Esperar
3 semanas



Dosis primaria 2

Dosis primaria adicional
para pacientes
inmunocomprometidos



Esperar
al menos
4 semanas



Dosis
primaria 3



Esperar
al menos
8 semanas
(2 meses)



Refuerzo
bivalente

Novavax

Edades de 12 años en adelante



Dosis primaria 1



Esperar 3 semanas



Dosis primaria 2



Esperar al menos 8 semanas (2 meses)



Refuerzo bivalente

Aviso: Se debe utilizar la vacuna bivalente de ARNm (Moderna o Pfizer) como dosis de refuerzo.



Vacúnese según las recomendaciones, incluso si tuvo COVID-19



Siga cumpliendo con el distanciamiento social y lleve mascarilla



Hable con su equipo de profesionales médicos si no está seguro sobre su riesgo