

PLANILLA 9 REGISTRO DE VACUNACIÓN

www.LLS.org/manual-del-cuidador

En el caso de los pacientes con cáncer, las inmunizaciones son particularmente importantes porque los tratamientos del cáncer debilitan el sistema inmunitario. Las inmunizaciones ayudan al cuerpo a crear resistencia contra enfermedades específicas.

Pregunte al equipo de profesionales médicos cuáles son las inmunizaciones que necesita el paciente.

El paciente probablemente recibió algunas inmunizaciones cuando era niño. Él o ella probablemente necesitará recibir otras inmunizaciones que se administran anualmente y dosis de refuerzo periódicas de ciertas vacunas para que las mismas sigan siendo eficaces. Puede que el paciente también necesite recibir nuevas inmunizaciones, según sus antecedentes médicos.

Pregunte al equipo de profesionales médicos qué inmunizaciones se recomiendan para el paciente. Use la tabla a continuación para llevar un registro de vacunación del paciente.

VACUNA	FECHA DE ADMINISTRACIÓN	FECHA INDICADA PARA LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN	COMENTARIOS/REACCIONES
Antigripal (influenza)			
Contra el tétanos, difteria y tos ferina (Td/Tdap, en inglés)			
Contra la culebrilla (zóster): RZV			
Antineumocócica: PCV13			
Antineumocócica: PPSV23			
Antimeningocócica: MenACWY			
Antimeningocócica: MenB			
Contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR, en inglés)*			
Contra el virus del papiloma humano (HPV, en inglés)			
Contra la varicela*			
Contra la hepatitis A			
Contra la hepatitis B			
Hib (<i>Haemophilus influenzae</i> de tipo b)			

*No se recomienda el uso de las vacunas marcadas con un asterisco en el caso de los pacientes con un sistema inmunitario debilitado. Si el paciente recibió estas vacunas antes de recibir el diagnóstico de cáncer, no es perjudicial.

Las personas que se someten al tratamiento del cáncer deberían recibir la vacuna antigripal que está producida con el virus muerto. No deberían recibir la vacuna en forma de aerosol nasal ya que esta contiene el virus vivo de la gripe. El virus vivo puede ser peligroso para los pacientes con inmunosupresión.

Las personas que se someten al tratamiento del cáncer y necesitan la vacuna contra la culebrilla (zóster) deberían recibir la vacuna recombinante contra la culebrilla (RZV, Shingrix) y no la vacuna viva (ZVL, Zostavax®).

Si el paciente tiene previsto viajar fuera de los Estados Unidos, compruebe las vacunas que se recomiendan para el lugar al cual viajará. Es posible que el paciente necesite recibir otras inmunizaciones. Consiga siempre la aprobación de los viajes consultando primero con el equipo de profesionales médicos.

Fuente: adaptada de la publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades titulada *Recommended Adult Immunization Schedule for ages 19 years or older, United States, 2019*.